



# 蛋蛋的哀傷 消失的蛋蛋-隱睾



狗貓的蛋蛋，在剛出生時其實是在腹腔裡的喔!! 大部份的蛋蛋會在“二個月齡到六個月齡前”，從腹腔經鼠蹊環、皮下進入陰囊中，如果在六個月齡之後蛋蛋還沒下降到陰囊中，那我們就可以確定這個小朋友有隱睾症。




## 隱睾已經確定和基因遺傳是有關係



所以有隱睾的動物不建議繁殖，因為這樣子可能會生下有同樣病症的小孩，除此之外，患病的動物還有較高的機率，有其他先天的疾病，例如臍疝氣、食道裂孔疝氣.....等等。

而不在陰囊中的蛋蛋，通常是沒有正常的功能的，也會有很高的機率病變成腫瘤(sertoli cell tumor, seminoma.....)，進而影響到動物的生命安全喔!




## 隱睾發生的位置: 腹腔、鼠蹊部、陰囊前。





診斷方式: 鼠蹊、陰囊隱睾，通常可以用觸診的方式診斷，少部份的大型犬、貓因為隱睾太深、太小，必須和腹腔隱睾一樣，使用超音波、斷層掃描、手術來診斷。

## 治療: 手術是唯一的治療方式。



## 腹腔鏡隱睾切除術 + 腹腔鏡輔助胃固定術



3 歲、德國狼犬，患有雙側腹腔隱睾，也因為是大型深胸犬，是胃擴張扭轉的高風險群，所在切除雙側隱睾時也利用腹腔鏡進行胃固定術。



### 術後傷口極小

狗狗身上只有二個小傷口(1cm、5cm)，就把兩個手術都順利完成了，如果使用傳統的手術方式的話，可是需要25-30cm以上的大傷口才能一起完全這個手術喔。



## 腹腔鏡隱睾切除術 + 腹腔鏡輔助胃固定術